


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Джили е средно късен сорт (135-140 дни вегетация)
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането, за да запазите тяхното качество
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Растояние на засаждане:

t

Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	18-19 см	15-16 см
	35/55	32-34 см	27-28 см
60+	28/35	20-21 см	17-18 см
	35/55	35-36 см	29-30 см


- Дълбочина на засаждане: нормална



- P_2O_5 12 кг/дка
- MgO 7-8 кг/дка
- Третирание на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксибробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)

ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка)

- ДЖИЛИ е леко чувствителен на Метрибузин приложен след поникването, да не се превишава макс. допустимата доза
- Джили е чувствителен на актив. вещество **Кломазон** (хербицид)
- N 15-17 кг/дка включ.. N_{min} – препоръчва се разделяне приложението на азота при поливни площи 2/3:1/3
- K_2O 30-35 кг/дка – при поливни площи разделете на два пъти 1/2:1/2
- Джили е чувствителен на Алтернария – препоръчва се ранно стартиране и редовно третирание срещу болеста
- Препоръчва се две третирания с **N** и **NP**- като листен тор за поддържане на посева в добро и енергично състояние



2/3 N
1/1 P_2O_5
1/2 K_2O
преди засаждане

Метрибузин след поникването трябва да се избягва

1/3 N
1/2 K_2O
при залагане на клубените

0,6 кг/дка
N-листен тор

0,6 кг/дка
N-P листен тор

Ранно стартиране на предпазните пръскания срещу мана

Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит, включително и от различните райони на Република България. Но тъй като картофите са естествен продукт, не можем да поемем отговорност за тези детайли.