


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ДЖОРДЖИНА е средно ранен сорт (120 - 130 дни вегетация)
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането, за да запазите тяхното качество
- Осигуреното и редовно поливане е от големо предимство
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Растояние на засаждане: ■ Дълбочина на засаждане: нормална


Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	18-20 см	14-16 см
	35/50	30-32 см	25-27 см
	35/55	32-34 см	27-28 см



- Не е известна чувствителност към Метрибузин
- MgO 7 кг/дка

ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка)

- Почви с висок риск от заразяване с обикновена краста трябва да се избягват
- Препоръчва се ранно започване с поливките –при образуване на кожицата
- Кратко стимулиране на покълването (3-4 дни преди засаждане)
- Третиране на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксибробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)
- N 14-16 кг/дка включ.. N_{min} като амоний или амид в зависимост от почвения тип/район/желания размер на клубените при пакетирание)-препоръчва се разделяне на торенето- 2/3:1/3
- P₂O₅ 12-13 кг/дка
- Едно или две подхранвания с P-K листен тор след цъфтеж
- K₂O 25 - 30 кг/дка (като K₂SO₄) – ако посевет се полива разделете торенето с K на 1/2:1/2
- ДЖОРДЖИНА е чувствителна на мана по листата – необходимо е ранно стартиране и редовно третиране срещу болеста до края на вегетацията
- Прибирайте навреме след узряване на кожицата за по-добро качество на продукцията!



Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит, включително и от различните райони на Република България. Но тъй като картофите са естествен продукт, не можем да поемем отговорност за тези детайли.