


## ДОНАТА (за пържене)

### ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ДОНАТА е средно ранен сорт (130-135 дни вегетация)
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Големите по-размер, дълго-овални клубени и високият добив изискват добре направени високи лехи
- Растояние на засаждане:
  - Дълбочина на засаждане: 3 см по-дълбоко от нормата

Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
	75 см	90 см
28/35	23 см	19 см
35/50	36 см	30 см
50/55	40 см	33 см
35/55	38 см	32 см




- Не е известна чувствителност към Метрибузин
- N-изискване на ДОНАТА е средно сравнено с местният стандарт (в зависимост от почвения тип/район/желан размер на клубените при пакетиране)
- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 12 кг/дка
- K<sub>2</sub>O 35 - 38 кг/дка (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)
- MgO 8 кг/дка
- След прибиране на продукцията, изсушете добре клубените с цел заздравяването на раните от механични повреди
- Съхранявайте при постоянна температура в склада ( 7°C )

### ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 6 т/дка)

- Почви с висок риск от вътрешни ръждиви трябва да се избягват
- След доставката на семената ,съхранявайте в насипно състояние или бокс палети (ако доставката е повече от 4 седмици преди засаждането – съхранявайте в студен склад на 5°C)
- Извадете семената от студения склад три седмици преди засаждането. Физиологично по-старите семена залагат повече клубени
- Повишете температурата на семената до 15°C една седмица преди засаждането им
- Дълбочина на засаждане с 3 см. по-дълбоко от нормалното
- Третиране на семената: препоръчва се обеззаразяване, но не третирайте семена които са току що покълнали или със счупени кълнове. За предпочитане е обработка на браздите. (Азоксистробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)
- Препоръчват се редовни пръскания за мана, пременете към фунгициди с предпазно действие върху клубените по-късно през сезона
- Препоръчват се предпазни пръскания срещу Алтернария
- Разделете N-торенето; приблизително 2/3 преди засаждане, 1/3 при залагане на клубените
- Препоръчва се подхранване с 0,6кг/дка листен азотен тор
- ДОНАТА е слабо чувствителен на механични повреди – прибирайте и обработвайте внимателно

Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит, включително и от различните райони на Република България. Но тъй като картофите са естествен продукт, не можем да поемем отговорност за тези детайли.



Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит, включително и от различните райони на Република България. Но тъй като картофите са естествен продукт, не можем да поемем отговорност за тези детайли.