


# КОРИНА

## ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- КОРИНА е много ранен до ранен сорт (65 - 80 дни вегетация)
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането ,за да запазите тяхното качество
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Растояние на засаждане:
  - Дълбочина на засаждане: нормална


Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	18-19 см	15-16 см
	35/55	32-34 см	26-27 см
60+	28/35	20-21 см	16-17 см
	35/55	35-36 см	27-28 см



- $P_2O_5$  10-12 кг/дка
- MgO 7 кг/дка
- Третирание на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксибробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)

## ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка )

- Почви с висок риск от заразяване с обикновена краста трябва да се избягват
- Препоръчва се подходящо затопляне на семената малко преди засаждането (2 дни с принудителна вентилация) за по- добро поникване и ранна реколта. Трябва да се избягва чупенето на кълновете
- КОРИНА е леко чувствителен на Метрибузин, да се избягва прилагането на високи дози след поникване
- N-изискване на Корина е 14-17 кг. N/дка включ.  $N_{min}$  (в зависимост от почвения тип/район/желан размер на клубените при пакетирание)
- $K_2O$  24 - 28 кг/дка (като  $K_2SO_4$ )
- КОРИНА е чувствителен на мана по листата – препоръчва се ранно стартиране и редовно третирание срещу болеста



1/1 N  
1/1  $P_2O_5$   
1/1  $K_2O$   
преди засаждане.

Избягвайте употреба на Метрибузин след поникването.

Ранен старт: защита от мана по листата

Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит,включително и от различните райони на Република България.Но тъй като картофите са естествен продукт,не можем да поемем отговорност за тези детайли.