


## ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ЛЕВАНТИНА е ранен сорт (90-110 дни вегетация)
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането, за да запазите тяхното качество
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Растояние на засаждане:

Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	17-19 см	14-16 см
	35/55	30-32 см	25-27 см
60+	28/35	19-21 см	16-18 см
	35/55	32-34 см	27-28 см


- Дълбочина на засаждане: нормална



- N 16-18 кг/дка включ. N<sub>min</sub> като амоний или амид
- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 12 кг/дка
- MgO 7-8 кг/дка
- Третирание на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксибробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)

## ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка)

- Почви с риск от заразяване с обикновена краста трябва да се избягват
- Трябва да се отглежда на по-добри почви със равномерно снабдяване с влага и хранителни вещества
- ЛЕВАНТИНА е леко чувствителен на Метрибузин, да се избягва прилагането след поникване
- N-изискване на ЛЕВАНТИНА е по-високо в сравнение с другите сортове (в зависимост от почвения тип/район/желания размер на клубените при пакетиране) – ако посева се полива, разделете приложението на 2/3:1/3
- K<sub>2</sub>O 28 – 30 кг/дка – ако посева се полива, разделете приложението на 1/2 (като KCl): 1/2
- ЛЕВАНТИНА е слабо чувствителен на мана – препоръчва се ранно стартиране и редовно третирание срещу болеста
- ЛЕВАНТИНА е леко чувствителен на механични повреди – изваждайте и прибирайте внимателно



Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит, включително и от различните райони на Република България. Но тъй като картофите са естествен продукт, не можем да поемем отговорност за тези детайли.