


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- МОНТАНА е средно ранен сорт (130 – 135 дни вегетация), много добър за съхранение
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането, за да запазите тяхното качество
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Растояние на засаждане: ■ Дълбочина на засаждане: нормална


Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	18-19 см	15-16 см
	35/55	30-32 см	24-25 см
60+	28/35	20-22 см	17-18 см
	35/55	34-36 см	27-29 см



- P₂O₅ 12 кг/дка
- MgO 7 кг/дка

ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка)

- Да се отглежда на почви с добър състав и постоянен запас на влага и хранителни вещества
- Третиране на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксистробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции), не третирайте семена които са току що покълнали или със счупени кълнове.
- Препоръчва се стимулиране на покълването непосредствено преди засаждане но да се избягва чупене на кълновете
- МОНТАНА е леко чувствителна на Метрибузин когато се прилага след поникване, това е добре да се избягва
- Ако Метрибузин се налага да бъде използван след поникване, разделете пръсканията на два пъти от 20 гр/дка и повторение след 5 дни
- N-изискването на сорта е 13 – 15 кг/дка, включ. N_{min} амоний или амид – разделете приложението 2/3:1/3 – възможно е и използването на стабилизирани N-тор
- K₂O 25 - 28 кг/дка (като K₂SO₄) – ако посева се полива разделете приложението на 2/3:1/3
- МОНТАНА е податлива на мана по листата и клубените – необходимо е ранно стартиране и редовно третиране срещу болеста до края на вегетацията



Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит, включително и от различните райони на Република България. Но тъй като картофите са естествен продукт, не можем да поемем отговорност за тези детайли.