


## ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- САНИБЕЛ е много ранен сорт (70 – 80 дни вегетация)
- Санибел образува втора кожа, така че кожата е червена за постоянно
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането, за да запазите тяхното качество
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Растояние на засаждане:

Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	15-17 см	13-14 см
	35/55	27-30 см	23-25 см
60+	28/35	18-20 см	15-17 см
	35/55	32-34 см	25-28 см


- Дълбочина на засаждане: нормална



- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 10-12 кг/дка
- MgO 7 кг/дка
- Третиране на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксистробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)

## ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка)

- САНИБЕЛ е чувствителен на Метрибузин преди и след поникването, затова трябва да се избягва
- N-изискването на САНИБЕЛ е подобно на другите много ранни сортове
- N 15-17 кг/дка включ.. N<sub>min</sub> (в зависимост от почвения тип/район/желания размер на клубените при пакетиране), ако посева се полива разделете приложението на 2/3:1/3
- K<sub>2</sub>O 27 - 30 кг/дка (като K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) – ако посева се полива разделете приложението на 1/2:1/2
- Санибел е чувствителен на мана по листата – препоръчва се ранно стартиране и редовно третиране срещу болеста
- Препоръчва се 1 или 2 пръскания срещу листни въшки
- Изваждайте и прибирайте реколтата внимателно



Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит, включително и от различните райони на Република България. Но тъй като картофите са естествен продукт, не можем да поемем отговорност за тези детайли.