


# АЛБЕРТИНЕ

## ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- АЛБЕРТИНЕ е много ранен до ранен сорт (70 - 80 дни вегетация)
- Извадете семената от чувалите веднага след пристигането ,за да запазите тяхното качество
- Подготовка на почвата: целта трябва да бъде дълбок и рохкав почвен слой
- Растояние на засаждане:

Желана големина на клубените	Размер на семената мм.	Растояние между редовете	
		75 см	90 см
40/60	28/35	18-19 см	15-16 см
	35/55	32-34 см	26-27 см
60+	28/35	20-21 см	16-17 см
	35/55	35-36 см	27-28 см




- Дълбочина на засаждане: нормална



- $P_2O_5$  8 кг/дка
- MgO 6 кг/дка
- Третирание на семената: препоръчва се обеззаразяване; за предпочитане обработка на браздите. (Азоксистробин показва добри резултати при обработка на почвата срещу много гъбични инфекции)

## ВАЖНИ ТОЧКИ (базирано на целеви среден добив 5 т/дка)

- Почви с висок риск от заразяване с обикновена краста трябва да се избягват.
- Леко чувствителен на Метрибузин преди и след поникване.
- Препоръчва се подходящо затопляне на семената малко преди засаждането за по-добро поникване и ранна реколта.
- N-изискване на АЛБЕРТИНЕ е 14-15 кг. N/дка включ.  $N_{min}$  (в зависимост от почвения тип/район/желан размер на клубените при пакетирание).
- $K_2O$  20 - 22 кг/дка (като  $K_2SO_4$ )
- АЛБЕРТИНЕ е леко чувствителен на мана по листата-препоръчва се ранно стартиране и редовно третирание срещу болеста.
- Бъдете внимателни с поливките в края на сезона.



Всички подробности се основават на резултати от официални сортови опити и/или наш собствен опит,включително и от различните райони на Република България.Но тъй като картофите са естествен продукт,не можем да поемем отговорност за тези детайли.